

# Personer intagna på SiS LVM-hem under 2022

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS, nr 6 2025



**Institutionsvård i fokus** ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförfarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom forsknings- och utvecklingsavdelningen. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS Forsknings- och utvecklingsavdelning samt Kommunikationsavdelningen.

*Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är  
SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.*

ISBN: 978-91-89770-05-8

Personer intagna på SiS LVM-hem under 2022

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.  
[www.stat-inst.se](http://www.stat-inst.se)

**Engelsk titel:** Institutional Care in Focus

**Publikationsseriens adress:**

Statens institutionsstyrelse  
Box 1062, 171 22 Solna

Copyright: Statens institutionsstyrelse  
Produktion: Stibo Complete. 2025.

 Svanenmärkt trycksak, 5041 0004

# Personer intagna på SiS LVM-hem under 2022

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

# Förord

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för individer med substansberoende. En person med mycket svårt och långtgående substansberoende kan bli omhändertagen för vård utan samtycke enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Den här tabellsammanställningen baseras på information från den intervju som görs med klienter vid intagning på ett LVM-hem (DOK inskrivningsintervju). Syftet med sammanställningen är att ge en beskrivning av klienternas bakgrund, deras situation inom olika livsområden<sup>1</sup> samt det behov av hjälp och stöd som de själva uppger vid intagning.

Tabellsammanställningen är framtagen vid SiS sektion för forskning och utvärdering.

---

<sup>1</sup> DOK-formulärets kapitel i intervjudelen kallas för livsområden. Ett livsområde ska spegla klientens vardagsliv. Fokus riktas mot faktorer som påverkar livet, som bland annat fysisk och psykisk hälsa, familj och relationer, bruk av alkohol och narkotika samt inblandning i kriminalitet.

# Innehållsförteckning

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inledning.....</b>                               | <b>7</b>  |
| <b>SiS inskrivningsintervju DOK .....</b>           | <b>8</b>  |
| <b>Lagrum för placering inom SiS .....</b>          | <b>9</b>  |
| <b>SiS vårdplatser och avdelningar.....</b>         | <b>10</b> |
| <b>Behandlingsplanering inom SiS .....</b>          | <b>11</b> |
| <b>Vård- och behandlingsinsatser inom SiS .....</b> | <b>12</b> |
| <b>SiS samarbete med socialtjänsten.....</b>        | <b>13</b> |
| <b>Materialet i sammanställningen.....</b>          | <b>14</b> |
| Datakvalitet .....                                  | 14        |
| Läsanvisningar .....                                | 14        |
| <b>Tabellsammanställning för år 2022 .....</b>      | <b>15</b> |
| <b>1. Administrativa uppgifter .....</b>            | <b>16</b> |
| Tabellförteckning.....                              | 16        |
| Tabeller .....                                      | 16        |
| <b>2. Behandlingskontakt .....</b>                  | <b>18</b> |
| Tabellförteckning.....                              | 18        |
| Tabeller .....                                      | 18        |
| <b>3. Alkohol och andra droger .....</b>            | <b>20</b> |
| Tabellförteckning.....                              | 20        |
| Tabeller .....                                      | 21        |
| <b>4. Hälsa .....</b>                               | <b>28</b> |
| Tabellförteckning.....                              | 28        |
| Tabeller .....                                      | 29        |
| <b>5. Kriminalitet .....</b>                        | <b>32</b> |
| Tabellförteckning.....                              | 32        |
| Tabeller .....                                      | 32        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Uppväxt.....</b>                     | <b>35</b> |
| Tabellförteckning.....                     | 35        |
| Tabeller.....                              | 35        |
| <b>7. Relationer .....</b>                 | <b>36</b> |
| Tabellförteckning.....                     | 36        |
| Tabeller.....                              | 36        |
| <b>8. Boende.....</b>                      | <b>38</b> |
| Tabellförteckning.....                     | 38        |
| Tabeller.....                              | 38        |
| <b>9. Utbildning och försörjning .....</b> | <b>40</b> |
| Tabellförteckning.....                     | 40        |
| Tabeller.....                              | 40        |
| <b>10. Sysselsättning och fritid .....</b> | <b>42</b> |
| Tabellförteckning.....                     | 42        |
| Tabeller.....                              | 42        |
| <b>Referenser .....</b>                    | <b>43</b> |

# Inledning

På SiS LVM-hem vårdas klienter enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-hemmen tar också emot ett mindre antal klienter som under kortare tid kan vårdas enligt socialtjänstlagen (2001:453, SoL), till exempel i samband med att LVM-vården avslutas och klienten inväntar plats på hem för vård och boende, HVB.

Tabellsammanställningen inleds med beskrivningar om DOK inskrivningsintervju, lagrummen för placering på SiS LVM-hem, SiS vård och behandling samt det material som används i tabellerna. Därefter redovisas resultatet av intervjuerna för varje livs-område i form av en inledande sammanfattning samt i tabeller.

# SiS inskrivningsintervju DOK

DOK (Dokumentationssystem inom missbruksvården) är en strukturerad intervju som används för att kartlägga problem, behov och resurser hos klienterna som placeras inom SiS. Intervjun fyller flera syften och består av ett stort antal frågor om bland annat substansberoende, kriminalitet, hälsa, försörjning samt familje- och boendesituation. Intervjun innefattar även uppgifter om klientens bakgrund och behandlingshistoria. Utöver de frågor som ställs inom varje område ombeds även klienterna att ange hur oroade de är över sin situation samt skatta sitt hjälpbehov inom varje område.

DOK inskrivningsintervju har flera syften och avser bland annat att göra klienten delaktig i sin vård och behandling genom att själv få beskriva sin situation, sina önskemål och sitt hjälpbehov. Kartläggningen med DOK syftar även till att skapa underlag för bedömning, utredning och behandlingsplanering.<sup>2</sup> Information från DOK intervjuerna ska också kunna användas för lokal verksamhetsuppföljning och planering där LVM-hemmen kan sammanställa uppgifter från flera intervjuer och på så sätt se vilka behov klienterna har som grupp och om dessa varierar över tid. På motsvarande sätt kan SiS centralt sammanställa uppgifter för att få en övergripande bild av målgruppen och kunna jämföra till exempel män och kvinnor eller olika åldersgrupper. Informationen från intervjuerna ska även kunna utgöra underlag för extern tillsyn och granskning, forskning samt för internationella statistikaktörer som EU:s narkotikabyrå, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

För att klienten ska kunna minnas och beskriva tiden innan placeringen så bra som möjligt, ska inskrivningsintervjun genomföras snarast och i samband med inskrivning på LVM-hemmet. De medarbetare som utsetts till att hålla intervjun har särskild utbildning i intervjuförfarande och dokumentation. Det tar i genomsnitt en timme att genomföra intervjuerna men tidsåtgången kan variera beroende på hur klienten mår. Det är frivilligt att delta i intervjun och vissa klienter vill eller kan av olika orsaker inte bli intervjuade. Den medarbetare som skulle ha genomfört intervjun ska i sådana fall besvara formulärets frågor om bakgrundsinformation och bortfall med hjälp av aktmaterial. Här registreras även anledningen till att intervjun inte genomfördes.

---

<sup>2</sup> DOK manual med tillhörande formulär & Rutin för Behandlingsplanering LVM, 1.4.2-6806-2020

# Lagrum för placering inom SiS

Enligt 4 § LVM ska tvångsvård beslutas om en person till följd av substansberoende är i behov av vård som inte kan ges på frivillig väg, och utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.<sup>3</sup> Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en anmälan till socialtjänsten. Även handläggare eller annan personal inom socialtjänsten kan informera socialnämnden om att frivilliga åtgärder inte är tillämpliga för individen och därefter kan en utredning påbörjas. Socialtjänsten utreder anmälan och om utredningen visar att det finns skäl att bereda personen vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.<sup>4</sup>

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan socialnämnden göra ett omedelbart omhändertagande i enlighet med 13 § LVM, som sedan kan gå över till planerad vård. Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande, ska beslutet senast dagen efter lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför institutionen så fort det är lämpligt. Den sammanlagda vårdtiden enligt LVM kan uppgå till sex månader men institutionschefen kan i samråd med socialtjänsten besluta om utskrivning tidigare än så.

<sup>3</sup> [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall\\_sfs-1988-87](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-87)

<sup>4</sup> LVM – Handbok för socialtjänsten

# SiS vårdplatser och avdelningar

Under 2022 fanns 359 platser (157 för kvinnor och 202 för män) fördelade över SiS elva LVM-hem. Vid fyra LVM-hem vårdades kvinnor och vid sju LVM-hem vårdades män.

LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande substansberoendet, påbörja behandling och motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. Vården inleds i låsbara former men så fort klientens fysiska och psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på LVM-hemmet. Vid vård enligt § 27 är klienten fortfarande inskriven i LVM-vården, men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i substansbruk under § 27-vistelsen kan klienten återföras till LVM-hemmet.

# Behandlingsplanering inom SiS

När en klient ska vårdas enligt LVM upprättar socialtjänsten en vårdplan för den vård som ska anordnas och formulerar ett uppdrag till den som ska utföra vården. Utifrån socialtjänstens vårdplan och uppdrag, som övergripande beskriver klientens behov, mål och insatser, ska SiS upprätta en behandlingsplan med fokus på genomförandet i detalj och över tid. Socialtjänstens underlag utgör, tillsammans med DOK inskrivningsintervju, kartläggning av substansberoendet samt samtal och kartläggningar som genomförs av avdelningspersonal, psykolog och sjuksköterska, grunden för att bedöma vårdbehov, formulera mål och planera behandlingsaktiviteter. I enlighet med SiS rutin för behandlingsplanering<sup>5</sup> och riktlinjer för utformning och genomförande av SiS LVM-vård<sup>6</sup> upprättas behandlingsplaner som anger vilka mål och delmål klienten ska arbeta med, vem som ansvarar för att genomföra de planerade aktiviteterna samt när och hur planen ska följas upp. Behandlingsplaneringen sker i flera steg i samverkan med klienten och socialtjänsten. För att klienten ska känna sig delaktig och ges inflytande över sin vård genomförs löpande avstämnings- och uppföljningssamtal där SiS medarbetare för dialog om behandlingsplanen och klientens egen uppfattning om vårdbehov och insatser. I de fall där det bedöms lämpligt och med klientens samtycke kan klientens familj eller nätverk göras delaktiga i behandlingsplaneringen.<sup>7</sup>

För klienterna inom LVM-vården utgör substansberoendet och dess konsekvenser det dominerande problemet och ska därför vara i fokus för aktiviteter och insatser. För att skapa bättre förutsättningar för livet efter avslutad vård är det också viktigt att beakta och adressera klientens övriga problem och resurser men behandlingsaktiviteterna måste inledningsvis anpassas till substansberoendet.

Alla klienter ska erbjudas att genomgå en fördjupad utredning (SiS utredning LVM) med fokus på substansberoendet, dess orsaker och konsekvenser samt relaterade områden som till exempel kriminalitet, social utsatthet och psykisk och fysisk hälsa.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Rutin för Behandlingsplanering LVM. Dnr 1.4.2-6806-2020

<sup>6</sup> Riktlinjer för utformning och genomförande av SiS LVM vård. Dnr 1.4.2-4652-2014

<sup>7</sup> Rutin för Behandlingsplanering LVM. Dnr 1.4.2-6806-2020

<sup>8</sup> SiS utredning LVM, Dnr 1.4.2 -1031- 2018

# Vård- och behandlingsinsatser inom SiS

Utgångspunkten för SiS vård och behandling är att genom omsorg och en fungerande vardagsstruktur verka för det som stabiliserar tillvaron under placeringen. Målsättningen är att skapa tillräcklig stabilitet i personens fungerande och livssituation så att fortsatta vårdinsatser kan ges utanför institutionsmiljön. Motivations- och förändringsarbete förutsätter grundläggande trygghet och säkerhet, välfungerande vardagsrutiner med tid för samtal och relationsskapande mellan klienten och behandlaren. Enligt SiS riktlinjer för kunskapsbaserade behandlingsprogram ska samtliga LVM-hem erbjuda behandlingsprogrammen ÅP (Återfallsprevention) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt strukturerade MI-samtal.<sup>9</sup> På ett mindre antal hem erbjuds behandlingsprogrammet ESL (Ett Självständigt Liv), som är avsett för klienter med lägre funktionsnivå.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Riktlinjer för arbete med kunskapsbaserade program. Dnr 1.4.2-904-2022.

<sup>10</sup> Läs mer om ESL pd: (<https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/behandlingsmetoder/>).

# SiS samarbete med socialtjänsten

Under vårdtiden har kommunernas socialtjänst det övergripande vårdansvaret för klienten och ska svara för att planera och följa upp vården. SiS ska löpande informera socialtjänsten om hur vården och behandlingen fortskrider.<sup>11</sup> Vid behandlingsstart ska socialtjänsten bjudas in till ett uppdragsmöte och därefter till regelbundna uppföljningsmöten. På uppföljningsmötena diskuteras utvecklingen av vården och behandlingen och vidare planering av denna. Socialtjänsten ska hållas uppdaterad om de framsteg som görs, vilka hinder som har identifierats och hur dessa har åtgärdats. Förslag på större förändringar av vård- och behandlingsinnehåll ska diskuteras och förankras med socialtjänsten. En dialog ska kontinuerligt föras med socialtjänsten om planering för placering för vård i annan form enligt 27 § LVM och för tiden efter utskrivning från SiS.<sup>12</sup>

För att åstadkomma varaktiga förändringar måste samarbetet mellan SiS, socialtjänsten och regionerna fungera väl och det behöver utifrån behov säkerställas fortsatta insatser såsom hälso- och sjukvård, vård av skadligt bruk och beroende, sysselsättning, utbildning och boende efter placeringen på SiS.

---

<sup>11</sup> LVM- Handbok för socialtjänsten

<sup>12</sup> Rutin för Behandlingsplanering LVM, 1.4.2-6806-2020

# Materialet i sammanställningen

Sammanställningens tabeller återger ett urval av klienternas svar på frågorna i DOK inskrivningsintervju samt intervjuarens svar på frågor om administrativa uppgifter och bortfall. En del klienter vårdas flera gånger enligt LVM under ett och samma år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger. I sammanställningen redovisas endast ett intervjutillfälle per klient.

## Datakvalitet

När intervjuer används som insamlingsmetod finns alltid en risk att svarspersonen anpassar sina svar efter till exempel intervjuarens och samhällets förväntningar. Klienterna som besvarar intervjun befinner sig också i en sårbar position och är omhändertagna med tvång, vilket i vissa fall kan tänkas påverka deras svar. Olika intervjuare kan också få olika svar eller tolka svaren på olika sätt. Denna felkälla minskas troligen genom intervjuformulärets struktur med nästan enbart fasta svarsalternativ, att intervjun har en tillhörande manual för genomförande samt att intervjuarna har genomgått utbildning. En annan möjlig felkälla är att frågorna ofta rör händelser som inträffat en tid tillbaka. För att minska andelen felaktiga svar ombeds även klienterna att hellre avstå från att svara än att ge osäkra eller felaktiga svar. Intervjun ska avbrytas om klienten bedöms ge oriktiga svar. Då bortfallet avseende deltagande i DOK inskrivningsintervju är stort behöver generaliseringar och tolkningar genomföras med försiktighet.

## Läsanvisningar

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun. Respektive område inleds med en resultatsammanfattning och en förteckning över ingående tabeller följt av tabellerna med klienternas svar. Klienternas svar redovisas fördelade på kön och ålder. I tabellrubriken framgår frågenumret i DOK inskrivningsformulär<sup>13</sup> samt vilken grupp klienter som redovisningen rör. I tabellens nedre del anges hur många som besvarat den aktuella frågan och det interna bortfallet. För att minska risken för att enskilda individer ska kunna identifieras i tabellerna, redogörs inte svar på frågor och delfrågor där exakt antal svar anges och som besvarats av färre än fem individer. Dessa svar markeras istället med ett kryss (x). Av samma anledning redovisas följdfrågor, det vill säga frågor som baseras på om klienten svarat ja på den föregående frågan, endast fördelat på kön eftersom antalet observationer ofta är för få för att även redovisas fördelat efter åldersgrupp.

<sup>13</sup> DOK- inskrivningsformulär med tillhörande manual finns tillgänglig på SiS webbplats.

# Tabellsammanställning för år 2022

Under 2022 genomfördes 890 intagningar (315 kvinnor och 575 män) på SiS LVM-hem. Majoriteten vårdades med stöd av LVM men vid kortare tillfällen under året vårdades 22 av dessa frivilligt på SiS med stöd av SoL.<sup>14</sup> I denna sammanställning redovisas endast en intervju per klient (5 intervjuer exkluderades).

Tabellsammanställningen bygger på information från de 494 klienter som deltog i de personliga intervjuerna under 2022, vilket utgör 59 procent av samtliga placerade under året. Av de intervjuade är 285 män (58 procent) och 209 kvinnor (42 procent). Klienterna som ingår är mellan 18 och 80 år gamla, med en medelålder på 37 år för båda könen. 5 intervjuer raderades för att de var dubletter.

---

<sup>14</sup> SiS i korthet 2022.

# I. Administrativa uppgifter

Inskrivningsformuläret kan besvaras på tre sätt. Nästintill ingen klient intervjuades över telefon medan strax över 70 procent av klienterna genomgick en personlig intervju. Nära 30 procent av klienterna ville eller kunde inte intervjuas och formulärets besvarades istället av behandlingspersonalen med hjälp av aktmaterial. Den vanligaste anledningen till att formuläret besvarats med aktmaterial var att klient inte ville medverka i en intervju (56 procent).

## TABELLFÖRTECKNING

*Denna del fylls i av SiS medarbetare*

- Tabell 1.1 Hur formuläret besvarats (A14a)
- Tabell 1.2 Upplever intervjuaren svaren som tillförlitliga (L1)
- Tabell 1.3 Klientens språkförståelse (L4)
- Tabell 1.4 Genomfördes hela intervjun vid ett tillfälle (L6a)
- Tabell 1.5 Genomsnittlig tid för intervju (L7)

## TABELLER

**Tabell 1.1 Hur formulären besvarats. Andel per kön och åldersgrupp (A14a). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | 45 år & äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år   | 30-44 år   |            |               |            |
| Personlig intervju   | 68         | 82         | 83          | 73         | 73         | 67         |               | <b>73</b>  |
| Telefonintervju      | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 1          |               | <b>0</b>   |
| Aktmaterial          | 32         | 17         | 17          | 27         | 27         | 32         |               | <b>27</b>  |
| Procentbas, antal    | 422        | 253        | 106         | 119        | 257        | 193        |               | <b>675</b> |
| Bortfall, antal      | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |               | <b>0</b>   |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>422</b> | <b>253</b> | <b>106</b>  | <b>119</b> | <b>257</b> | <b>193</b> |               | <b>675</b> |

*Max ett formulär per klient ingår. Formulär besvarade med aktmaterial ingår inte i resten av rapporten.*

**Tabell 1.2 Upplever intervjuaren svaren som tillförlitliga. Andel per kön och åldersgrupp (L1). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år & äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |               |            |
| Ja                   | 93         | 85         | 85          | 89        | 94         | 87         |               | <b>90</b>  |
| Nej                  | 7          | 15         | 15          | 11        | 6          | 13         |               | <b>10</b>  |
| Procentbas, antal    | 269        | 191        | 81          | 82        | 174        | 123        |               | <b>460</b> |
| Bortfall, antal      | 16         | 18         | 7           | 5         | 14         | 8          |               | <b>34</b>  |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |               | <b>494</b> |

**Tabell 1.3 Klientens språkförståelse. Andel per kön och åldersgrupp (L4). Procent.**

|                                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |               | Samtliga   |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|
|                                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   | 45 år & äldre |            |
| God språkförståelse                  | 97         | 95         | 94          | 96        | 96         | 98            | <b>96</b>  |
| Viss språkförståelse                 | 3          | 4          | 6           | 4         | 4          | 2             | <b>4</b>   |
| Använt tolk/teckentolk vid intervjun | 0          | 1          | 0           | 0         | 0          | 1             | <b>0</b>   |
| Procentbas, antal                    | 271        | 194        | 83          | 83        | 174        | 125           | <b>465</b> |
| Bortfall, antal                      | 14         | 15         | 5           | 4         | 14         | 6             | <b>29</b>  |
| <b>Totalt, antal</b>                 | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b>    | <b>494</b> |

**Tabell 1.4 Genomfördes hela intervjun vid ett och samma tillfälle?  
Andel per kön och åldersgrupp (L6a). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |               | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   | 45 år & äldre |            |
| Ja                   | 77         | 67         | 73          | 64        | 66         | 88            | <b>73</b>  |
| Nej                  | 23         | 33         | 27          | 36        | 34         | 12            | <b>27</b>  |
| Procentbas, antal    | 272        | 194        | 83          | 83        | 175        | 125           | <b>466</b> |
| Bortfall, antal      | 13         | 15         | 5           | 4         | 13         | 6             | <b>28</b>  |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b>    | <b>494</b> |

**Tabell 1.5 Genomsnittlig tid för intervju i minuter per kön och åldersgrupp (L7).**

|                | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |               | Samtliga   |
|----------------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------------|------------|
|                | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år | 45 år & äldre |            |
| Antal minuter  | 73  | 73     | 71          | 75       | 75       | 71            | <b>73</b>  |
| Antal klienter | 272 | 192    | 83          | 83       | 174      | 124           | <b>464</b> |

*Det totala bortfallet är 6,1 procent.*

## 2. Behandlingskontakt

Många av de klienter som placeras enligt LVM har en lång historik av skadligt bruk och beroende. Två tredjedelar av klienterna uppger att de tidigare har fått vård för narkotikaanvändning. Fördelat på åldersgrupper uppger 92 procent av klienterna i åldersgruppen 25–29 år och 22 procent av klienterna i åldersgruppen 45 år och äldre att de vårdats för narkotikaanvändning. Nära hälften av alla klienter uppger att de tidigare vårdats för alkoholanvändning, problematiken är dock vanligast i de äldre åldersgrupperna (30 och äldre). Det är 38 procent av klienterna som uppger att de tidigare vårdats för användning av läkemedel. Drygt en femtedel av klienterna har tidigare vårdats enligt LVU, 33 procent har tidigare vårdats enligt LPT och 38 procent har tidigare vårdats enligt LVM. Nästan två tredjedelar av klienterna har erfarenhet av frivillig psykiatrisk vård.

### TABELLFÖRTECKNING

*Denna del besvaras av klienterna*

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabell 2.1 | Tidigare vård för alkohol, narkotika eller läkemedel (B2)                                                      |
| Tabell 2.2 | Tidigare sökt hjälp för alkohol, narkotika eller läkemedel (B4)                                                |
| Tabell 2.3 | Frivillig psykiatrisk vård, någon gång (B5a1, B5a2)                                                            |
| Tabell 2.4 | Frivillig psykiatrisk vård, senaste sex månaderna (B5c1, B5c2)                                                 |
| Tabell 2.5 | Tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT, någon gång (B6a1, B6a2, B6a3). Genomsnittlig tid för intervju (L7) |
| Tabell 2.6 | Tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT, senaste sex månaderna (B6c1, B6c2, B6c3)                           |

### TABELLER

**Tabell 2.1 Tidigare vård för användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp (B2). Procent.**

|           | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga  |
|-----------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|-----------|
|           | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |           |
| Alkohol   | 50  | 45     | 22          | 29       | 51       | 73 |               | <b>48</b> |
| Narkotika | 59  | 67     | 82          | 92       | 67       | 22 |               | <b>62</b> |
| Läkemedel | 39  | 36     | 41          | 55       | 44       | 15 |               | <b>38</b> |

*Det totala bortfallet för respektive fråga är 0,8 – 1,6 procent.*

**Tabell 2.2 Tidigare själv sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B4). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år & äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |               |            |
| Ja                   | 79         | 76         | 69          | 85        | 87         | 67         |               | <b>78</b>  |
| Nej                  | 21         | 24         | 31          | 15        | 13         | 33         |               | <b>22</b>  |
| Procentbas, antal    | 273        | 195        | 83          | 85        | 175        | 125        |               | <b>468</b> |
| Bortfall, antal      | 12         | 14         | 5           | 2         | 13         | 6          |               | <b>26</b>  |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |               | <b>494</b> |

**Tabell 2.3 Någon gång fått frivillig psykiatrisk vård.  
Andel per kön och åldersgrupp (B5a1, B5a2). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Ja                   | 61         | 64         | 61          | 68        | 71         | 47         |                  | <b>62</b>  |
| Nej                  | 39         | 36         | 39          | 32        | 29         | 53         |                  | <b>38</b>  |
| Procentbas, antal    | 281        | 208        | 88          | 87        | 184        | 130        |                  | <b>489</b> |
| Bortfall, antal      | 4          | 1          | 0           | 0         | 4          | 1          |                  | <b>5</b>   |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

**Tabell 2.4 Fått frivillig psykiatrisk vård senaste sex månaderna.  
Andel per kön och åldersgrupp (B5c1, B5c2). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Ja                   | 35         | 39         | 45          | 43        | 40         | 23         |                  | <b>37</b>  |
| Nej                  | 65         | 61         | 55          | 57        | 60         | 77         |                  | <b>63</b>  |
| Procentbas, antal    | 276        | 205        | 85          | 86        | 182        | 128        |                  | <b>481</b> |
| Bortfall, antal      | 9          | 4          | 3           | 1         | 6          | 3          |                  | <b>13</b>  |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

**Tabell 2.5 Någon gång tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT.  
Andel per kön och åldersgrupp (B6a1, B6a2, B6a3). Procent.**

|     | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år &<br>äldre | Samtliga  |
|-----|-----|--------|-------------|----------|----------|----|------------------|-----------|
|     | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |                  |           |
| LVU | 17  | 26     | 39          | 31       | 18       | 7  |                  | <b>21</b> |
| LVM | 33  | 44     | 15          | 47       | 41       | 42 |                  | <b>38</b> |
| LPT | 30  | 37     | 34          | 47       | 38       | 18 |                  | <b>33</b> |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 0,4 – 1,6 procent.

**Tabell 2.6 Vårdad enligt LVU, LVM eller LPT de senaste sex månaderna.  
Andel per kön och åldersgrupp (B6c1, B6c2, B6c3). Procent.**

|     | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |   | 45 år &<br>äldre | Samtliga  |
|-----|-----|--------|-------------|----------|----------|---|------------------|-----------|
|     | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |   |                  |           |
| LVU | 1   | 1      | 3           | 1        | 1        | 0 |                  | <b>1</b>  |
| LVM | 7   | 14     | 5           | 18       | 10       | 8 |                  | <b>10</b> |
| LPT | 13  | 18     | 22          | 21       | 17       | 5 |                  | <b>15</b> |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 0,4 – 1,6 procent.

### 3. Alkohol och andra droger

Alkohol är den vanligaste primärdrogen<sup>15</sup> för både kvinnor och män. Fördelat på åldersgrupper är alkohol som primärdrog vanligast i de två äldsta åldersgrupperna (30 år och äldre), medan centralstimulerande medel är vanligast för den yngsta åldersgruppen (18–24 år). För åldersgruppen 25–29 är opioider något vanligare än centralstimulerande medel. Hälften av klienterna uppger att de någon gång injicerat och 23 procent att de har ett aktivt injektionsbruk (injicerat under de senaste 30 dagarna). Drygt hälften av klienterna uppger att de har ett aktuellt blandbruk av substanser, definierat som att ha använt flera olika substanser vid samma dag, de senaste 30 dagarna vid tiden för intervjun. Blandbruk är vanligt i alla åldersgrupper utom den äldsta (45 år och äldre). Debutåldern är lägst för alkohol (14 år) följt av marijuana och lösningsmedel (16 år). Substitutionsbehandling kan genomföras vid skadligt bruk och beroende av opioider, 8 procent av klienterna uppger att de har en pågående substitutionsbehandling och 11 procent uppger att de tidigare har genomfört substitutionsbehandling.

#### TABELLFÖRTECKNING

*Denna del besvaras av klienterna*

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tabell 3.1  | Användning av droger, någon gång (C1_1a-C1_18a)                                |
| Tabell 3.2  | Användning av läkemedel utan ordination, någon gång (C2_21a-C2_27a)            |
| Tabell 3.3  | Användning av droger, senaste sex månaderna (C1_1c-C1_18c)                     |
| Tabell 3.4  | Användning av läkemedel utan ordination, senaste sex månaderna (C2_21c-C2_27c) |
| Tabell 3.5  | Användning av droger, senaste 30 dagarna (C1_1d-C1_18d)                        |
| Tabell 3.6  | Användning av läkemedel utan ordination, senaste 30 dagarna (C2_21d-C2_27d)    |
| Tabell 3.7  | Genomsnittlig debutålder för olika preparat (C1_1b-C1_18b, C2_21b-C2_27b)      |
| Tabell 3.8  | Primärdrog (C3_1a)                                                             |
| Tabell 3.9  | Använt olika preparat samma dag, senaste 30 dagarna (C4)                       |
| Tabell 3.10 | Injektionsmissbruk (C5a)                                                       |
| Tabell 3.11 | Genomsnittlig debutålder vid injektion (C5b)                                   |
| Tabell 3.12 | Deltagit i sprututbytesprogram (C5a, C6)                                       |
| Tabell 3.13 | Delat injektionsverktyg (C5a, C7)                                              |
| Tabell 3.14 | Substitutionsbehandling (C8a)                                                  |
| Tabell 3.15 | Läkemedelsbehandling för alkoholberoende (C9a)                                 |
| Tabell 3.16 | Senaste missbruksfria period (C10a)                                            |

<sup>15</sup> Med primärdrog avses den drog som orsakar mest problem/utgör anledning till intagning på SiS (DOK-inskrivningsformulär).

## TABELLER

**Tabell 3.1 Användning av olika droger någonsin.  
Andel per kön och åldersgrupp (C1\_1a – C1\_18a). Procent.**

|                            | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |     | 45 år &<br>äldre | Samtliga  |
|----------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|-----|------------------|-----------|
|                            | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |     |                  |           |
| Alkohol                    | 97  | 95     | 95          | 96       | 94       | 100 |                  | <b>96</b> |
| Hasch                      | 76  | 76     | 95          | 94       | 84       | 39  |                  | <b>76</b> |
| Amfetaminer                | 70  | 75     | 80          | 88       | 86       | 36  |                  | <b>72</b> |
| Marijuana                  | 69  | 69     | 89          | 88       | 80       | 27  |                  | <b>69</b> |
| Kokain                     | 58  | 63     | 82          | 80       | 70       | 18  |                  | <b>60</b> |
| MDMA/ecstasy/andra derivat | 53  | 55     | 76          | 71       | 62       | 15  |                  | <b>53</b> |
| Heroin                     | 45  | 44     | 41          | 59       | 55       | 21  |                  | <b>44</b> |
| Andra opioider             | 44  | 43     | 52          | 60       | 51       | 17  |                  | <b>44</b> |
| Metamfetaminer             | 39  | 40     | 34          | 57       | 49       | 18  |                  | <b>40</b> |
| LSD                        | 41  | 31     | 49          | 46       | 45       | 10  |                  | <b>37</b> |
| Ketamin                    | 30  | 27     | 34          | 48       | 32       | 6   |                  | <b>28</b> |
| Andra hallucinogener       | 28  | 23     | 29          | 39       | 33       | 5   |                  | <b>26</b> |
| GHB, GBL                   | 23  | 16     | 16          | 17       | 34       | 6   |                  | <b>20</b> |
| Crack                      | 17  | 17     | 23          | 21       | 22       | 2   |                  | <b>17</b> |
| Lösningsmedel              | 20  | 9      | 18          | 15       | 20       | 8   |                  | <b>16</b> |
| Syntetiska katinoner       | 16  | 9      | 18          | 14       | 16       | 6   |                  | <b>13</b> |
| Anabola steroider          | 18  | 2      | 7           | 13       | 18       | 5   |                  | <b>11</b> |
| Annat kokain               | 9   | 5      | 10          | 11       | 9        | 2   |                  | <b>7</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 4,7 – 6,5 procent.

**Tabell 3.2 Användning av läkemedel utan eller utöver ordination någonsin.  
Andel per kön och åldersgrupp (C2\_21a – C2\_27a). Procent.**

|                                | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år &<br>äldre | Samtliga  |
|--------------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|------------------|-----------|
|                                | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |                  |           |
| Bensodiazepiner                | 66  | 72     | 86          | 88       | 81       | 26 |                  | <b>69</b> |
| Buprenorfin                    | 54  | 51     | 57          | 74       | 65       | 18 |                  | <b>53</b> |
| Metadon                        | 34  | 28     | 20          | 42       | 45       | 14 |                  | <b>32</b> |
| Andra smärtstillande läkemedel | 37  | 23     | 51          | 37       | 34       | 10 |                  | <b>31</b> |
| Fentanyl                       | 28  | 25     | 17          | 35       | 38       | 12 |                  | <b>27</b> |
| Andra dämpande läkemedel       | 21  | 12     | 20          | 19       | 24       | 6  |                  | <b>17</b> |
| Barbiturater                   | 11  | 2      | 2           | 4        | 13       | 3  |                  | <b>7</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 4,7 – 6,3 procent.

**Tabell 3.3 Användning av olika droger de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp (C1\_1c – C1\_18c). Procent.**

|                                                | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga  |
|------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|-----------|
|                                                | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |           |
| Alkohol                                        | 83  | 70     | 67          | 69       | 73       | 97 |               | <b>78</b> |
| Amfetaminer                                    | 50  | 56     | 60          | 66       | 66       | 20 |               | <b>53</b> |
| Hasch                                          | 49  | 54     | 80          | 72       | 53       | 15 |               | <b>51</b> |
| Marijuana                                      | 43  | 46     | 70          | 65       | 48       | 9  |               | <b>44</b> |
| Kokain                                         | 31  | 33     | 54          | 48       | 33       | 6  |               | <b>32</b> |
| Andra opioider                                 | 31  | 29     | 36          | 48       | 35       | 9  |               | <b>31</b> |
| Heroin                                         | 24  | 27     | 26          | 40       | 32       | 7  |               | <b>26</b> |
| Metamfetamin                                   | 21  | 27     | 21          | 38       | 29       | 8  |               | <b>24</b> |
| MDMA, ecstasy och andra derivat av stimulantia | 16  | 23     | 29          | 29       | 22       | 2  |               | <b>19</b> |
| Ketamin                                        | 10  | 11     | 16          | 15       | 11       | 1  |               | <b>10</b> |
| LSD                                            | 8   | 8      | 11          | 10       | 11       | 1  |               | <b>8</b>  |
| Crack                                          | 7   | 8      | 12          | 8        | 10       | 0  |               | <b>7</b>  |
| Andra hallucinogener                           | 7   | 5      | 6           | 14       | 6        | 1  |               | <b>6</b>  |
| GHB, GBL                                       | 6   | 6      | 5           | 8        | 9        | 1  |               | <b>6</b>  |
| Syntetiska katinoner                           | 4   | 4      | 9           | 4        | 5        | 0  |               | <b>4</b>  |
| Lösningsmedel                                  | 4   | 3      | 7           | 1        | 5        | 1  |               | <b>3</b>  |
| Anabola steroider                              | 4   | 0      | 4           | 1        | 3        | 2  |               | <b>3</b>  |
| Annat kokain                                   | 3   | 2      | 2           | 4        | 3        | 0  |               | <b>2</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,3 – 8,7 procent.

**Tabell 3.4 Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp (C2\_21c – C2\_27c). Procent.**

|                                | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga  |
|--------------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|-----------|
|                                | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |           |
| Bensodiazepiner                | 57  | 63     | 77          | 79       | 72       | 18 |               | <b>60</b> |
| Buprenorfin                    | 34  | 36     | 38          | 57       | 41       | 9  |               | <b>35</b> |
| Andra smärtstillande läkemedel | 22  | 15     | 30          | 24       | 23       | 5  |               | <b>19</b> |
| Metadon                        | 13  | 14     | 10          | 19       | 19       | 5  |               | <b>14</b> |
| Andra dämpande läkemedel       | 12  | 9      | 13          | 15       | 15       | 1  |               | <b>11</b> |
| Fentanyl                       | 11  | 7      | 6           | 14       | 12       | 4  |               | <b>9</b>  |
| Barbiturater                   | 2   | 1      | 2           | 2        | 2        | 0  |               | <b>2</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,9 – 6,7 procent.

**Tabell 3.5 Användning av olika droger de senaste 30 dagarna.  
Andel per kön och åldersgrupp (C1\_1d – C1\_18d). Procent.**

|                                                     | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år &<br>äldre | Samtliga  |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|------------------|-----------|
|                                                     | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |                  |           |
| Alkohol                                             | 68  | 53     | 40          | 48       | 59       | 89 |                  | <b>62</b> |
| Hasch                                               | 40  | 37     | 60          | 54       | 39       | 15 |                  | <b>39</b> |
| Amfetaminer                                         | 36  | 41     | 46          | 51       | 46       | 15 |                  | <b>38</b> |
| Marijuana                                           | 33  | 31     | 49          | 46       | 36       | 7  |                  | <b>32</b> |
| Andra opioider                                      | 26  | 19     | 26          | 37       | 26       | 8  |                  | <b>23</b> |
| Heroin                                              | 18  | 19     | 20          | 29       | 22       | 6  |                  | <b>19</b> |
| Metamfetaminer                                      | 17  | 22     | 14          | 32       | 24       | 7  |                  | <b>19</b> |
| Kokain                                              | 18  | 17     | 35          | 22       | 18       | 4  |                  | <b>18</b> |
| MDMA, ecstasy eller andra derivat av<br>stimulantia | 7   | 10     | 17          | 11       | 9        | 1  |                  | <b>8</b>  |
| Ketamin                                             | 5   | 5      | 6           | 8        | 5        | 1  |                  | <b>5</b>  |
| Crack                                               | 5   | 3      | 9           | 1        | 6        | 0  |                  | <b>4</b>  |
| LSD                                                 | 3   | 4      | 5           | 4        | 6        | 0  |                  | <b>4</b>  |
| Syntetiska katinoner                                | 2   | 3      | 5           | 4        | 3        | 0  |                  | <b>3</b>  |
| Andra hallucinogener                                | 3   | 2      | 1           | 5        | 3        | 1  |                  | <b>3</b>  |
| Lösningsmedel                                       | 3   | 2      | 5           | 1        | 3        | 1  |                  | <b>3</b>  |
| GHB, GBL                                            | 3   | 3      | 2           | 5        | 4        | 0  |                  | <b>3</b>  |
| Annat kokain                                        | 1   | 1      | 1           | 0        | 2        | 0  |                  | <b>1</b>  |
| Anabola steroider                                   | 3   | 0      | 1           | 1        | 2        | 2  |                  | <b>1</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,3 – 8,7 procent.

**Tabell 3.6 Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp (C2\_21d – C2\_27d). Procent.**

|                                | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år &<br>äldre | Samtliga  |
|--------------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|------------------|-----------|
|                                | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |                  |           |
| Bensodiazepiner                | 47  | 48     | 60          | 61       | 59       | 16 |                  | <b>48</b> |
| Buprenorfin                    | 25  | 25     | 25          | 35       | 33       | 7  |                  | <b>25</b> |
| Andra smärtstillande läkemedel | 17  | 11     | 23          | 18       | 16       | 5  |                  | <b>15</b> |
| Metadon                        | 9   | 7      | 4           | 10       | 13       | 3  |                  | <b>8</b>  |
| Andra dämpande läkemedel       | 9   | 6      | 11          | 9        | 11       | 1  |                  | <b>8</b>  |
| Fentanyl                       | 6   | 4      | 1           | 7        | 8        | 2  |                  | <b>5</b>  |
| Barbiturater                   | 2   | 1      | 1           | 2        | 2        | 0  |                  | <b>1</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,9 – 7,3 procent.

**Tabell 3.7 Genomsnittlig debutålder för olika preparat per kön och åldersgrupp (C1\_1b – C1\_18b, C2\_21b – C2\_27b).**

|                                | Kön   |     |        |     | Åldersgrupp |    |       |    |       |     |       |     | Samtliga |     |
|--------------------------------|-------|-----|--------|-----|-------------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|----------|-----|
|                                | Man   |     | Kvinna |     | 18-24       |    | 25-29 |    | 30-44 |     | 45+   |     |          |     |
|                                | Ålder | N   | Ålder  | N   | Ålder       | N  | Ålder | N  | Ålder | N   | Ålder | N   | Ålder    | N   |
| Alkohol                        | 14    | 260 | 14     | 184 | 14          | 76 | 13    | 79 | 14    | 167 | 16    | 122 | 14       | 444 |
| Heroin                         | 24    | 117 | 23     | 84  | 19          | 34 | 21    | 49 | 24    | 94  | 30    | 24  | 23       | 201 |
| Andra opioider                 | 20    | 109 | 20     | 74  | 17          | 37 | 18    | 46 | 21    | 83  | 27    | 17  | 20       | 183 |
| Kokain                         | 22    | 147 | 21     | 111 | 18          | 60 | 20    | 64 | 23    | 115 | 31    | 19  | 22       | 258 |
| Crack                          | 25    | 44  | 22     | 30  | x           | x  | x     | x  | x     | x   | x     | x   | 24       | 74  |
| Annat kokain                   | 23    | 20  | 20     | 7   | x           | x  | x     | x  | x     | x   | x     | x   | 22       | 27  |
| Amfetaminer                    | 20    | 183 | 20     | 139 | 17          | 63 | 18    | 73 | 21    | 145 | 24    | 41  | 20       | 322 |
| Metamfetaminer                 | 20    | 88  | 20     | 68  | 17          | 23 | 19    | 42 | 20    | 71  | 25    | 20  | 20       | 156 |
| Syntetiska katinoner           | 22    | 39  | 21     | 17  | 17          | 12 | 20    | 12 | 22    | 25  | 35    | 7   | 22       | 56  |
| MDMA/ecstasy                   | 21    | 132 | 20     | 101 | 17          | 60 | 19    | 57 | 22    | 101 | 31    | 15  | 21       | 233 |
| LSD                            | 22    | 103 | 22     | 54  | 18          | 39 | 22    | 35 | 23    | 73  | 28    | 10  | 22       | 157 |
| Ketamin                        | 24    | 76  | 25     | 50  | 19          | 27 | 24    | 39 | 27    | 53  | 33    | 7   | 24       | 126 |
| Andra hallucinogener           | 21    | 66  | 20     | 40  | 18          | 23 | 21    | 31 | 21    | 49  | 24    | 3   | 20       | 106 |
| Hasch                          | 16    | 205 | 17     | 139 | 15          | 74 | 15    | 79 | 17    | 146 | 21    | 45  | 17       | 344 |
| Marijuana                      | 16    | 182 | 17     | 125 | 15          | 70 | 15    | 72 | 17    | 135 | 19    | 30  | 16       | 307 |
| Lösningsmedel                  | 16    | 49  | 17     | 15  | 16          | 13 | 13    | 11 | 17    | 31  | 15    | 9   | 16       | 64  |
| GHB, GBL                       | 23    | 58  | 23     | 30  | 20          | 12 | 23    | 14 | 23    | 56  | 29    | 6   | 23       | 88  |
| Anabola steroider              | x     | x   | x      | x   | x           | x  | x     | x  | x     | x   | x     | x   | 24       | 33  |
| Metadon                        | 25    | 82  | 24     | 49  | 19          | 13 | 21    | 32 | 25    | 75  | 38    | 11  | 25       | 131 |
| Buprenorfin                    | 24    | 133 | 22     | 97  | 19          | 42 | 21    | 59 | 24    | 110 | 36    | 19  | 23       | 230 |
| Barbiturater                   | x     | x   | x      | x   | x           | x  | x     | x  | x     | x   | x     | x   | 22       | 28  |
| Bensodiazepiner                | 21    | 171 | 21     | 132 | 18          | 66 | 19    | 74 | 22    | 135 | 29    | 28  | 21       | 303 |
| Andra dämpande läkemedel       | 21    | 51  | 20     | 19  | x           | x  | x     | x  | x     | x   | x     | x   | 21       | 70  |
| Fentanyl                       | 26    | 67  | 24     | 46  | 18          | 12 | 22    | 28 | 26    | 61  | 38    | 12  | 25       | 113 |
| Andra smärtstillande läkemedel | 20    | 94  | 21     | 45  | 17          | 40 | 19    | 30 | 23    | 57  | 29    | 12  | 21       | 139 |

x= Innehåller celler med (n)= fem personer eller färre.

**Tabell 3.8 Primärdrag. Andel per kön och åldersgrupp (C3\_1a). Procent.**

|                           | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |     | 45 år & äldre | Samtliga |
|---------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|-----|---------------|----------|
|                           | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |     |               |          |
| Alkohol                   | 47  | 33     | 9           | 13       | 38       | 86  | 41            |          |
| Opioider                  | 15  | 23     | 19          | 32       | 20       | 6   | 18            |          |
| Centralstimulerande medel | 15  | 23     | 26          | 29       | 21       | 3   | 18            |          |
| Lugnande medel            | 12  | 11     | 19          | 13       | 14       | 2   | 11            |          |
| Hallucinogener            | 0   | 0      | 0           | 0        | 0        | 0   | 0             |          |
| Cannabis                  | 9   | 4      | 17          | 11       | 3        | 2   | 7             |          |
| Andra medel               | 3   | 5      | 10          | 2        | 5        | 0   | 4             |          |
| Procentbas, antal         | 282 | 205    | 86          | 87       | 184      | 130 | 487           |          |
| Bortfall, antal           | 3   | 4      | 2           | 0        | 4        | 1   | 7             |          |
| Totalt, antal             | 285 | 209    | 88          | 87       | 188      | 131 | 494           |          |

**Tabell 3.9 Använt flera olika medel under samma dag de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp (C4). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |               | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   | 45 år & äldre |            |
| Ja                   | 57         | 57         | 73          | 69        | 66         | 26            | 57         |
| Nej                  | 43         | 43         | 27          | 31        | 34         | 74            | 43         |
| Procentbas, antal    | 273        | 196        | 83          | 83        | 177        | 126           | 469        |
| Bortfall, antal      | 12         | 13         | 5           | 4         | 11         | 5             | 25         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b>    | <b>494</b> |

**Tabell 3.10 Injektionsmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp (C5a). Procent.**

|                                                                                   | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |               | Samtliga   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|
|                                                                                   | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   | 45 år & äldre |            |
| Aldrig injicerat                                                                  | 52         | 44         | 53          | 31        | 38         | 72            | 49         |
| Injicerat någon gång, men inte det senaste året                                   | 12         | 13         | 13          | 11        | 13         | 13            | 13         |
| Injicerat någon gång under det senaste året, men inte under de senaste 30 dagarna | 13         | 19         | 13          | 16        | 22         | 8             | 16         |
| Injicerar för närvarande (under senaste 30 dagarna)                               | 22         | 23         | 22          | 41        | 26         | 6             | 23         |
| Procentbas, antal                                                                 | 283        | 209        | 88          | 87        | 187        | 130           | 492        |
| Bortfall, antal                                                                   | 2          | 0          | 0           | 0         | 1          | 1             | 2          |
| <b>Totalt, antal</b>                                                              | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b>    | <b>494</b> |

**Tabell 3.11 Genomsnittlig ålder vid första injektion per kön och åldersgrupp (C5b).**

|            | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |               | Samtliga |
|------------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------------|----------|
|            | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år | 45 år & äldre |          |
| Medelålder | 23  | 23     | 20          | 22       | 25       | 26            | 23       |
| Antal      | 130 | 115    | 39          | 58       | 115      | 33            | 245      |

**Tabell 3.12 Deltagit i sprutbytesprogram. Klienter som någon gång har injicerat (C5a). Andel per kön och åldersgrupp (C6). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |               | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   | 45 år & äldre |            |
| Ja                   | 48         | 56         | 39          | 66        | 52         | 36            | 51         |
| Nej                  | 52         | 44         | 61          | 34        | 48         | 64            | 49         |
| Procentbas, antal    | 130        | 106        | 36          | 58        | 109        | 33            | 236        |
| Bortfall, antal      | 6          | 11         | 5           | 2         | 7          | 3             | 17         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>136</b> | <b>117</b> | <b>41</b>   | <b>60</b> | <b>116</b> | <b>36</b>     | <b>253</b> |

**Tabell 3.13 Delat injektionsverktyg med andra. Klienter som någon gång har injicerat (C5a). Andel per kön och åldersgrupp (C7). Procent.**

|                                                             | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |           | 45 år & äldre | Samtliga   |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|------------|
|                                                             | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |           |               |            |
| Nej, aldrig                                                 | 32         | 31         | 50          | 18        | 33         | 28        |               | <b>31</b>  |
| Delat men inte det senaste året                             | 23         | 23         | 8           | 25        | 20         | 47        |               | <b>23</b>  |
| Delat det senaste året men inte under de senaste 30 dagarna | 29         | 29         | 20          | 35        | 32         | 19        |               | <b>29</b>  |
| Delat de senaste 30 dagarna                                 | 16         | 17         | 23          | 22        | 15         | 6         |               | <b>16</b>  |
| Procentbas, antal                                           | 134        | 117        | 40          | 60        | 115        | 36        |               | <b>251</b> |
| Bortfall, antal                                             | 2          | 0          | 1           | 0         | 1          | 0         |               | <b>2</b>   |
| <b>Totalt, antal</b>                                        | <b>136</b> | <b>117</b> | <b>41</b>   | <b>60</b> | <b>116</b> | <b>36</b> |               | <b>253</b> |

**Tabell 3.14 Substitutionsbehandling för opioidmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp (C8a). Procent.**

|                                | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år & äldre | Samtliga   |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
|                                | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |               |            |
| Nej                            | 83         | 79         | 94          | 78        | 71         | 91         |               | <b>82</b>  |
| Ja, men inte för närvarande    | 11         | 11         | 3           | 13        | 16         | 7          |               | <b>11</b>  |
| Ja, har en pågående behandling | 6          | 10         | 2           | 9         | 13         | 2          |               | <b>8</b>   |
| Procentbas, antal              | 284        | 209        | 88          | 87        | 187        | 131        |               | <b>493</b> |
| Bortfall, antal                | 1          | 0          | 0           | 0         | 1          | 0          |               | <b>1</b>   |
| <b>Totalt, antal</b>           | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |               | <b>494</b> |

**Tabell 3.15 Läkemedelsbehandling för alkoholberoende. Andel per kön och åldersgrupp (C9a). Procent.**

|                                | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år & äldre | Samtliga   |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
|                                | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |               |            |
| Nej                            | 59         | 69         | 91          | 80        | 56         | 43         |               | <b>63</b>  |
| Ja, men inte för närvarande    | 39         | 27         | 7           | 19        | 39         | 55         |               | <b>34</b>  |
| Ja, har en pågående behandling | 2          | 4          | 1           | 1         | 5          | 2          |               | <b>3</b>   |
| Procentbas, antal              | 273        | 196        | 82          | 84        | 177        | 126        |               | <b>469</b> |
| Bortfall, antal                | 12         | 13         | 6           | 3         | 11         | 5          |               | <b>25</b>  |
| <b>Totalt, antal</b>           | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |               | <b>494</b> |

**Tabell 3.16 Senaste missbruksfria period. Andel per kön och åldersgrupp (C10a). Procent.**

|                                           | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                                           | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Mindre än 6 månader sedan                 | 39         | 44         | 38          | 43        | 39         | 45         |                  | <b>41</b>  |
| Mellan 6 månader och 1 år sedan           | 25         | 24         | 26          | 27        | 21         | 27         |                  | <b>25</b>  |
| 2 till 5 år sedan                         | 22         | 21         | 22          | 26        | 26         | 12         |                  | <b>21</b>  |
| Mer än 5 år sedan                         | 10         | 6          | 4           | 5         | 9          | 12         |                  | <b>8</b>   |
| Har aldrig haft någon missbruksfri period | 5          | 5          | 10          | 0         | 6          | 4          |                  | <b>5</b>   |
| Procentbas, antal                         | 263        | 188        | 77          | 82        | 171        | 121        |                  | <b>451</b> |
| Bortfall, antal                           | 22         | 21         | 11          | 5         | 17         | 10         |                  | <b>43</b>  |
| <b>Totalt, antal</b>                      | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

## 4. Hälsa

SiS bedriver hälso- och sjukvård som är öppen och frivillig och följer gällande bestämmelser inom hälso- och sjukvården. LVM-hemmen ska ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper som passar för verksamheten. De flesta klienter anger att de har haft någon form av hälsoproblem under de senaste sex månaderna före intagning på SiS. De fyra vanligaste hälsoproblemen för alla klienter i fallande ordning är: sömnstörningar, svårigheter att förstå/minnas eller koncentrera sig, värk/smärta och ångest. Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de har haft psykosociala problem. Det gäller alla typer av psykosociala problem i formuläret förutom okontrollerat spelande och okontrollerad våldsanvändning. Hälften av kvinnorna uppger att de någon gång försökt skada sig själv och 39 procent att de har försökt att ta sitt liv. Motsvarande siffror för männen är 38 och 34 procent. Drygt en tredjedel av samtliga klienter uppger att de blivit diagnosticerade med ADHD/ADD, tillståndet är vanligast i åldersgrupperna 18–24 år (40 procent), 25–29 år (51 procent) och 30–44 år (47 procent) men mindre vanligt i åldersgruppen 45 år och äldre (15 procent).

### TABELLFÖRTECKNING

*Denna del besvaras av klienterna*

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabell 4.1 | Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd (D1)                                      |
| Tabell 4.2 | Röker dagligen (D2a)                                                                          |
| Tabell 4.3 | Snusar dagligen (D2b)                                                                         |
| Tabell 4.4 | Förekomst av hepatit eller HIV (D6a, D6b, D6d)                                                |
| Tabell 4.5 | Gravid vid intagning (D7a)                                                                    |
| Tabell 4.6 | Förekomst av hälsoproblem, senaste sex månaderna (D8a_1b-D8a_20b)                             |
| Tabell 4.7 | Utretts för ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom (D11a_1a-D11a_4a)     |
| Tabell 4.8 | Fått diagnosen ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom (D11a_1b-D11a_4b)  |
| Tabell 4.9 | Olika typer av känslor eller handlingar som klienten har upplevt, någon gång (D12_1a-D12_10a) |

## TABELLER

**Tabell 4.1 Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd.  
Andel per kön och åldersgrupp (D1). Procent.**

|                         | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                         | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Mycket bra              | 15         | 11         | 11          | 14        | 17         | 10         |                  | <b>13</b>  |
| Bra                     | 35         | 35         | 37          | 41        | 31         | 36         |                  | <b>35</b>  |
| Varken bra eller dåligt | 28         | 34         | 29          | 30        | 32         | 31         |                  | <b>31</b>  |
| Dåligt                  | 14         | 14         | 16          | 7         | 14         | 19         |                  | <b>14</b>  |
| Mycket dåligt           | 7          | 5          | 7           | 7         | 7          | 5          |                  | <b>6</b>   |
| Procentbas, antal       | 273        | 196        | 83          | 83        | 177        | 126        |                  | <b>469</b> |
| Bortfall, antal         | 12         | 13         | 5           | 4         | 11         | 5          |                  | <b>25</b>  |
| <b>Totalt, antal</b>    | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

**Tabell 4.2 Röker dagligen. Andel per kön och åldersgrupp (D2a). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Ja                   | 60         | 83         | 75          | 87        | 73         | 51         |                  | <b>70</b>  |
| Nej                  | 40         | 17         | 25          | 13        | 27         | 49         |                  | <b>30</b>  |
| Procentbas, antal    | 273        | 196        | 83          | 83        | 177        | 126        |                  | <b>469</b> |
| Bortfall, antal      | 12         | 13         | 5           | 4         | 11         | 5          |                  | <b>25</b>  |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

**Tabell 4.3 Snusar dagligen. Andel per kön och åldersgrupp (D2b). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Ja                   | 63         | 36         | 52          | 42        | 61         | 45         |                  | <b>52</b>  |
| Nej                  | 37         | 64         | 48          | 58        | 39         | 55         |                  | <b>48</b>  |
| Procentbas, antal    | 273        | 196        | 83          | 83        | 177        | 126        |                  | <b>469</b> |
| Bortfall, antal      | 12         | 13         | 5           | 4         | 11         | 5          |                  | <b>25</b>  |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

**Tabell 4.4 Förekomst av hepatit och HIV.  
Andel per kön och åldersgrupp (D6a, D6b, D6d). Procent.**

|           | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år &<br>äldre | Samtliga  |
|-----------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|------------------|-----------|
|           | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |                  |           |
| Hepatit B | 2   | 2      | 3           | 1        | 3        | 2  |                  | <b>2</b>  |
| Hepatit C | 16  | 17     | 7           | 19       | 23       | 11 |                  | <b>16</b> |
| HIV/Aids  | 1   | 2      | 1           | 2        | 1        | 1  |                  | <b>1</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 7,9 – 12,6 procent.

**Tabell 4.5 Kvinnor gravida vid intagningen. Andel per åldersgrupp (D7a). Procent.**

|                      | Åldersgrupp |           |           |               | Samtliga   |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|
|                      | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år  | 45 år & äldre |            |
| Ja                   | 3           | 9         | 0         | 0             | 2          |
| Nej                  | 97          | 91        | 100       | 100           | 98         |
| Procentbas, antal    | 37          | 47        | 79        | 38            | 201        |
| Bortfall, antal      | 3           | 3         | 2         | 0             | 8          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>40</b>   | <b>50</b> | <b>81</b> | <b>38</b>     | <b>209</b> |

**Tabell 4.6 Förekomst av olika typer av hälsoproblem de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp (D8a\_1b – D8a\_20b). Procent.**

|                                                       | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |               | Samtliga |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------------|----------|
|                                                       | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år | 45 år & äldre |          |
| Sömnstörningar                                        | 77  | 84     | 80          | 76       | 88       | 72            | 80       |
| Svårigheter med förståelse, minne eller koncentration | 63  | 73     | 77          | 77       | 75       | 44            | 67       |
| Annan värk/smärta                                     | 60  | 59     | 52          | 54       | 66       | 60            | 60       |
| Ångest                                                | 55  | 60     | 58          | 59       | 66       | 43            | 57       |
| Tandproblem                                           | 42  | 51     | 34          | 48       | 52       | 43            | 46       |
| Huvudvärk/migrän                                      | 41  | 46     | 57          | 49       | 44       | 29            | 43       |
| Syn-/hörselproblem                                    | 39  | 41     | 28          | 30       | 39       | 55            | 40       |
| Depression                                            | 32  | 36     | 39          | 34       | 41       | 20            | 34       |
| Social fobi                                           | 31  | 35     | 33          | 31       | 45       | 18            | 33       |
| Rörlighets-/balansproblem                             | 30  | 30     | 18          | 28       | 28       | 43            | 30       |
| Hjärt-/blodtrycksproblem                              | 33  | 23     | 21          | 20       | 29       | 40            | 29       |
| Allergi/astma                                         | 26  | 34     | 24          | 30       | 34       | 25            | 29       |
| Mag-/tarmbesvär                                       | 27  | 33     | 22          | 21       | 35       | 32            | 29       |
| Tvångstankar                                          | 25  | 28     | 29          | 29       | 33       | 12            | 26       |
| Hallucinationer                                       | 22  | 23     | 34          | 29       | 24       | 8             | 22       |
| Problem med andra inre organ                          | 19  | 17     | 12          | 18       | 17       | 23            | 18       |
| Andra hälsoproblem                                    | 19  | 16     | 16          | 15       | 21       | 18            | 18       |
| Underlivsbesvär                                       | 5   | 17     | 10          | 11       | 10       | 9             | 10       |
| Epilepsi                                              | 11  | 9      | 8           | 7        | 11       | 10            | 10       |
| Diabetes                                              | 8   | 4      | 4           | 6        | 5        | 10            | 6        |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,1 – 6,7 procent.

**Tabell 4.7 Utretts för ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Andel per kön och åldersgrupp (D11a\_1a – D11a\_4a). Procent.**

|                   | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga  |
|-------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|-----------|
|                   | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |           |
| ADHD/ADD          | 45  | 50     | 50          | 63       | 59       | 18 |               | <b>47</b> |
| Aspergers syndrom | 10  | 15     | 10          | 20       | 16       | 2  |               | <b>12</b> |
| Autism            | 11  | 17     | 13          | 23       | 18       | 2  |               | <b>14</b> |
| Tourettes syndrom | 3   | 5      | 2           | 8        | 4        | 1  |               | <b>4</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,1 – 6,7 procent.

**Tabell 4.8 Fått diagnosen ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Andel per kön och åldersgrupp (D11a\_1b – D11a\_4b). Procent.**

|                   | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga  |
|-------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|-----------|
|                   | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |           |
| ADHD              | 33  | 45     | 40          | 51       | 47       | 15 |               | <b>38</b> |
| Aspergers syndrom | 6   | 6      | 6           | 6        | 8        | 3  |               | <b>6</b>  |
| Autism            | 5   | 9      | 9           | 11       | 8        | 2  |               | <b>7</b>  |
| Tourettes syndrom | 1   | 1      | 3           | 0        | 1        | 1  |               | <b>1</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 8,3 – 9,7 procent.

**Tabell 4.9 Olika typer av känslor och handlingar som klienten någon gång har upplevt. Andel per kön och åldersgrupp (D12\_1a – D12\_10a). Procent.**

|                                                                                      | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|-----------|
|                                                                                      | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |           |
| Känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel                                   | 15  | 7      | 11          | 7        | 16       | 8  |               | <b>11</b> |
| Känt att mat, vikt eller träning kontrollerar livet                                  | 25  | 37     | 35          | 33       | 36       | 16 |               | <b>30</b> |
| Kräkts för att bli av med mat hen just ätit                                          | 7   | 33     | 27          | 23       | 18       | 7  |               | <b>18</b> |
| Haft fler sexualpartners än hen egentligen hade velat                                | 16  | 33     | 25          | 30       | 27       | 12 |               | <b>23</b> |
| Utsatt sig för risken att bli smittad av könssjukdomar                               | 40  | 48     | 51          | 54       | 52       | 19 |               | <b>43</b> |
| Tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsam                                  | 52  | 51     | 54          | 65       | 61       | 28 |               | <b>52</b> |
| Känt att hen måste göra vissa saker på ett visst sätt för att dämpa oro eller ångest | 32  | 38     | 39          | 39       | 43       | 18 |               | <b>35</b> |
| Avsiktligt försökt skada sig själv                                                   | 38  | 51     | 53          | 52       | 46       | 26 |               | <b>43</b> |
| Känt att hen skulle vilja ta sitt eget liv                                           | 47  | 51     | 57          | 59       | 48       | 38 |               | <b>49</b> |
| Försökt ta sitt eget liv                                                             | 34  | 39     | 38          | 48       | 37       | 25 |               | <b>36</b> |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,5 – 6,7 procent.

## 5. Kriminalitet

I avsnittet kriminalitet redogörs klienternas svar på frågor som rör klientens egen kriminalitet samt utsatthet för andras kriminella handlingar. Det är 72 procent av klienterna som uppger att de blivit utsatta för fysiskt våld där fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn. Drygt hälften av klienterna uppger att de blivit utsatta för hot och 62 procent av kvinnorna och 9 procent av männen uppger att de blivit utsatta för sexuella övergrepp. Drygt hälften uppger att de har utsatt någon annan för fysiskt våld, 41 procent uppger att de utsatt någon för hot och 1 procent av klienterna uppger att de har utsatt någon för sexuella övergrepp. Tre fjärdedelar av klienterna uppger att de någon gång blivit dömda för brott och ungefär en tredjedel uppger att de blivit dömda till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Det är vanligast att klienterna uppger att de någon gång dömts för narkotikabrott, följt av egendomsbrott, rattfylleri och våldsbrott/rån.

### TABELLFÖRTECKNING

*Denna del besvaras av klienterna*

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabell 5.1 | Blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp, någon gång (E1_1a-E1_3a)            |
| Tabell 5.2 | Utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp, någon gång (E2_1a-E2_3a)             |
| Tabell 5.3 | Blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp, senaste sex månaderna (E1_1c-E1_3c) |
| Tabell 5.4 | Utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp, senaste sex månaderna (E2_1c-E2_3c)  |
| Tabell 5.5 | Bevittnat att person i närhet utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller hot (E3)          |
| Tabell 5.6 | Blivit dömd för brott, någon gång (E4a)                                                   |
| Tabell 5.7 | Typ av brott klienter dömts för, någon gång (E4b_1a-E4b_5a)                               |
| Tabell 5.8 | Blivit dömd till fängelse eller rättspsykiatrisk vård, någon gång (E5, E6)                |

### TABELLER

**Tabell 5.1 Någon gång blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp (E1\_1a – E1\_3a). Procent.**

|                    | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga |
|--------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|----------|
|                    | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |          |
| Fysiskt våld       | 71  | 74     | 69          | 75       | 78       | 65 |               | 72       |
| Hot                | 46  | 66     | 56          | 54       | 64       | 41 |               | 55       |
| Sexuella övergrepp | 9   | 62     | 33          | 44       | 39       | 12 |               | 31       |

*Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,5 – 6,1 procent.*

**Tabell 5.2 Någon gång utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp (E2\_1a – E2\_3a). Procent.**

|                    | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga  |
|--------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|-----------|
|                    | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |           |
| Fysiskt våld       | 58  | 51     | 54          | 63       | 66       | 34 |               | <b>55</b> |
| Hot                | 46  | 35     | 45          | 54       | 47       | 21 |               | <b>41</b> |
| Sexuella övergrepp | 1   | 1      | 0           | 2        | 2        | 0  |               | <b>1</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,5 – 6,1 procent.

**Tabell 5.3 Under de senaste sex månaderna blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp (E1\_1c – E1\_3c). Procent.**

|                    | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga  |
|--------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|-----------|
|                    | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |           |
| Fysiskt våld       | 21  | 39     | 32          | 31       | 35       | 17 |               | <b>29</b> |
| Hot                | 14  | 35     | 22          | 25       | 30       | 12 |               | <b>23</b> |
| Sexuella övergrepp | 0   | 17     | 10          | 10       | 10       | 0  |               | <b>7</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 7,3 – 7,5 procent.

**Tabell 5.4 Under de senaste sex månaderna utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp (E2\_1c – E2\_3c). Procent.**

|                    | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |   | 45 år & äldre | Samtliga  |
|--------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|---|---------------|-----------|
|                    | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |   |               |           |
| Fysiskt våld       | 20  | 21     | 26          | 28       | 25       | 6 |               | <b>21</b> |
| Hot                | 16  | 15     | 22          | 18       | 22       | 2 |               | <b>15</b> |
| Sexuella övergrepp | 0   | 1      | 0           | 0        | 1        | 0 |               | <b>0</b>  |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,5 – 7,7 procent.

**Tabell 5.5 Bevittnat att person i ens närhet utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller hot. Andel per kön och åldersgrupp (E3). Procent.**

|                           | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år & äldre | Samtliga   |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
|                           | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |               |            |
| Nej                       | 69         | 69         | 65          | 63        | 65         | 82         |               | <b>69</b>  |
| Ja, vid enstaka tillfälle | 18         | 21         | 21          | 22        | 24         | 11         |               | <b>20</b>  |
| Ja, vid flera tillfällen  | 13         | 10         | 14          | 16        | 11         | 7          |               | <b>11</b>  |
| Procentbas, antal         | 269        | 196        | 81          | 83        | 175        | 126        |               | <b>465</b> |
| Bortfall, antal           | 16         | 13         | 7           | 4         | 13         | 5          |               | <b>29</b>  |
| <b>Totalt, antal</b>      | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |               | <b>494</b> |

**Tabell 5.6 Någon gång blivit dömd för något brott.  
Andel per kön och åldersgrupp (E4a). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Ja                   | 81         | 67         | 73          | 84        | 80         | 63         |                  | 75         |
| Nej                  | 19         | 33         | 27          | 16        | 20         | 37         |                  | 25         |
| Procentbas, antal    | 283        | 208        | 86          | 87        | 187        | 131        |                  | 491        |
| Bortfall, antal      | 2          | 1          | 2           | 0         | 1          | 0          |                  | 3          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

**Tabell 5.7 Typ av brott dömda klienter någon gång dömts för.  
Andel per kön och åldersgrupp (E4b\_1a – E4b\_5a). Procent.**

|                | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år &<br>äldre | Samtliga |
|----------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|------------------|----------|
|                | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |                  |          |
| Narkotikabrott | 69  | 78     | 92          | 87       | 77       | 36 |                  | 73       |
| Egendomsbrott  | 50  | 57     | 42          | 55       | 65       | 35 |                  | 52       |
| Rattfylleri    | 59  | 28     | 31          | 31       | 49       | 72 |                  | 47       |
| Våldsbrott/rån | 44  | 33     | 20          | 45       | 46       | 38 |                  | 40       |
| Övriga brott   | 44  | 32     | 34          | 41       | 49       | 25 |                  | 39       |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 4,9 – 5,2 procent.

**Tabell 5.8 Någon gång blivit dömd till fängelse eller rättspsykiatrisk vård.  
Andel per kön och åldersgrupp (E5, E6). Procent.**

|                       | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år &<br>äldre | Samtliga |
|-----------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|------------------|----------|
|                       | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |                  |          |
| Fängelse              | 43  | 22     | 11          | 32       | 39       | 43 |                  | 34       |
| Rättspsykiatrisk vård | 2   | 2      | 1           | 1        | 2        | 4  |                  | 2        |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 0,2 – 0,6 procent.

## 6. Uppväxt

Många av klienterna har upplevt svårigheter under uppväxten. På frågor om olika problem i uppväxtmiljön anger nästan hälften förekomst av skadligt bruk och beroende, 40 procent förekomst av psykiska problem och 37 procent förekomst av misshandel/våld under uppväxten. Kvinnorna rapporterar jämfört med männen mer problem i samtliga kategorier. Drygt en fjärdedel av klienterna har varit placerade i familjehem under uppväxten.

### TABELLFÖRTECKNING

*Denna del besvaras av klienterna*

Tabell 6.1 Varit placerad i familjehem, någon gång (F5a)

Tabell 6.2 Förekomst av olika problem i uppväxtmiljön (F6)

### TABELLER

**Tabell 6.1 Någon gång varit placerad i familjehem under uppväxten.  
Andel per kön och åldersgrupp (F5a). Procent.**

|     |                   | Kön |        | Åldersgrupp |          |          | 45 år &<br>äldre | Samtliga |
|-----|-------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|------------------|----------|
|     |                   | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |                  |          |
| Ja  |                   | 24  | 34     | 38          | 36       | 31       | 13               | 28       |
| Nej |                   | 76  | 66     | 63          | 64       | 69       | 87               | 72       |
|     | Procentbas, antal | 282 | 207    | 88          | 86       | 185      | 130              | 489      |
|     | Bortfall, antal   | 3   | 2      | 0           | 1        | 3        | 1                | 5        |
|     | Totalt, antal     | 285 | 209    | 88          | 87       | 188      | 131              | 494      |

**Tabell 6.2 Förekomst av olika problem i uppväxtmiljön.  
Andel per kön och åldersgrupp (F6). Procent.**

|                  | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år &<br>äldre | Samtliga |
|------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|------------------|----------|
|                  | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |                  |          |
| Missbruk         | 44  | 49     | 43          | 61       | 52       | 30 | 46               |          |
| Psykiska problem | 32  | 51     | 46          | 54       | 44       | 22 | 40               |          |
| Misshandel/våld  | 32  | 44     | 42          | 45       | 39       | 26 | 37               |          |

*Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,7 – 8,3 procent.*

## 7. Relationer

Nästan en tredjedel av klienterna uppger att de har minderåriga barn där 30 procent av kvinnorna och 10 procent av männen uppger att de har vårdnad om sina barn. Det är 4 procent av klienterna som bor med sina barn. Drygt hälften av kvinnorna uppger att de någon gång blivit utsatta för våld, hot eller övergrepp av någon närstående och 26 procent av männen uppger detsamma. Det är 27 procent av kvinnorna och 21 procent av männen som uppger att de någon gång har utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp. Andelen kvinnor som någon gång utfört en sexuell handling mot ersättning är högre än andelen män, 32 respektive 6 procent.

### TABELLFÖRTECKNING

*Denna del besvaras av klienterna*

- Tabell 7.1 Klienter med barn under 18 år (G2)
- Tabell 7.2 Lever med och har vårdnad av barn under 18 år (G5)
- Tabell 7.3 Utfört sexuell handling mot ersättning (G10)
- Tabell 7.4 Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående (G11)
- Tabell 7.5 Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp (G12)

### TABELLER

**Tabell 7.1 Klienter med barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp (G2). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år & äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |               |            |
| Ja                   | 24         | 42         | 14          | 30        | 46         | 24         |               | 32         |
| Nej                  | 76         | 58         | 86          | 70        | 54         | 76         |               | 68         |
| Procentbas, antal    | 276        | 206        | 85          | 84        | 186        | 127        |               | 482        |
| Bortfall, antal      | 9          | 3          | 3           | 3         | 2          | 4          |               | 12         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |               | <b>494</b> |

**Tabell 7.2 Klienter som lever med och klienter som har vårdnad om barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp (G5). Procent.**

|                     | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga |
|---------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|----------|
|                     | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |          |
| Lever med barn      | 3   | 4      | 2           | 1        | 5        | 5  |               | 4        |
| Har vårdnad om barn | 10  | 30     | 11          | 20       | 24       | 15 |               | 19       |

*Det totala bortfallet för respektive fråga är 2,2 – 2,6 procent.*

**Tabell 7.3 Utfört sexuell handling mot ersättning. Andel per kön och åldersgrupp (G10). Procent.**

|                       | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |   | 45 år & äldre | Samtliga |
|-----------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|---|---------------|----------|
|                       | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |   |               |          |
| Någon gång            | 6   | 32     | 20          | 29       | 20       | 2 |               | 17       |
| Senaste sex månaderna | 1   | 13     | 10          | 11       | 6        | 0 |               | 6        |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 7,1 procent.

**Tabell 7.4 Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående. Andel per kön och åldersgrupp (G11). Procent.**

|                       | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga |
|-----------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|----------|
|                       | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |          |
| Någon gång            | 26  | 55     | 38          | 52       | 39       | 28 |               | 38       |
| Senaste sex månaderna | 4   | 18     | 9           | 20       | 9        | 6  |               | 10       |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,9 – 7,3 procent.

**Tabell 7.5 Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp (G12). Procent.**

|                       | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år & äldre | Samtliga |
|-----------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|---------------|----------|
|                       | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |               |          |
| Någon gång            | 21  | 27     | 33          | 34       | 23       | 11 |               | 23       |
| Senaste sex månaderna | 5   | 8      | 10          | 12       | 5        | 2  |               | 6        |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,7 – 7,3 procent.

## 8. Boende

Det är vanligt att LVM-klienter lever i en socialt utsatt situation. Drygt en tredjedel av klienterna har någon gång vräkts från en bostad och 17 procent av kvinnorna och 14 procent av männen uppger att de var bostadslösa under halvåret före intagningen på SiS. Det är 44 procent av klienterna som uppger att de bodde i en egen bostad.

### TABELLFÖRTECKNING

*Denna del besvaras av klienterna*

Tabell 8.1 Ägt bostad eller haft förstahandskontrakt (H1)

Tabell 8.2 Hur klienten huvudsakligen bott, senaste sex månaderna (H2a\_1)

Tabell 8.3 Någon gång blivit vräkt (H3)

### TABELLER

**Tabell 8.1 Ägt bostad eller haft förstahandskontrakt.  
Andel per kön och åldersgrupp (H1). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Ja                   | 79         | 84         | 49          | 74        | 89         | 95         |                  | <b>81</b>  |
| Nej                  | 21         | 16         | 51          | 26        | 11         | 5          |                  | <b>19</b>  |
| Procentbas, antal    | 271        | 196        | 80          | 84        | 177        | 126        |                  | <b>467</b> |
| Bortfall, antal      | 14         | 13         | 8           | 3         | 11         | 5          |                  | <b>27</b>  |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

**Tabell 8.2 Hur klienten huvudsakligen bott de senaste sex månaderna.  
Andel per kön och åldersgrupp (H2a\_1). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Egen bostad          | 45         | 42         | 31          | 36        | 41         | 62         |                  | <b>44</b>  |
| Annat ordnat boende  | 29         | 20         | 36          | 31        | 25         | 15         |                  | <b>25</b>  |
| Stödboende           | 7          | 7          | 8           | 3         | 9          | 7          |                  | <b>7</b>   |
| Bostadslös           | 14         | 17         | 9           | 20        | 19         | 12         |                  | <b>15</b>  |
| Övrigt boende        | 5          | 13         | 15          | 10        | 7          | 5          |                  | <b>9</b>   |
| Procentbas, antal    | 283        | 208        | 86          | 87        | 187        | 131        |                  | <b>491</b> |
| Bortfall, antal      | 2          | 1          | 2           | 0         | 1          | 0          |                  | <b>3</b>   |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

**Tabell 8.3 Någon gång blivit vräkt. Andel per kön och åldersgrupp (H3). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Ja                   | 35         | 38         | 20          | 33        | 45         | 36         |                  | <b>36</b>  |
| Nej                  | 65         | 62         | 80          | 67        | 55         | 64         |                  | <b>64</b>  |
| Procentbas, antal    | 267        | 194        | 80          | 81        | 174        | 126        |                  | <b>461</b> |
| Bortfall, antal      | 18         | 15         | 8           | 6         | 14         | 5          |                  | <b>33</b>  |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

## 9. Utbildning och försörjning

Drygt hälften av klienterna har fullföljt gymnasium, fackskola eller högre utbildning medan 18 procent saknar grundskola, folkskola eller motsvarande. Ungefär en femtedel av klienterna uppger att de har läs- eller skrivsvårigheter. Närmare hälften av klienterna får sin huvudsakliga försörjning genom stöd från socialtjänsten eller ersättning från försäkringskassan. Det är 12 procent av klienterna som uppger att de försörjer sig genom kriminella handlingar, flest i åldern 25–29 år och endast ett fåtal bland de som är 45 år och äldre. Mer än hälften (57 procent) av klienterna uppger att de har skulder i form av lån/krediter och 29 procent har skulder i form av skadestånd.

### TABELLFÖRTECKNING

*Denna del besvaras av klienterna*

- Tabell 9.1 Högsta fullföljda utbildningsnivå (I1)  
 Tabell 9.2 Läs- eller skrivsvårigheter (I3)  
 Tabell 9.3 Huvudsakligt försörjningssätt, senaste sex månaderna (I5a\_1)  
 Tabell 9.4 När klienten senast hade ett regelbundet arbete (I6c)  
 Tabell 9.5 Typ av skulder (I8b)

### TABELLER

**Tabell 9.1 Högsta fullföljda utbildningsnivå. Andel per kön och åldersgrupp (I1). Procent.**

|                                                        | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år & äldre | Samtliga   |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
|                                                        | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |               |            |
| Inte fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande | 20         | 15         | 29          | 18        | 17         | 12         |               | 18         |
| Folkskola, grundskola eller motsvarande                | 28         | 33         | 43          | 38        | 23         | 26         |               | 30         |
| Gymnasium, fackskola eller motsvarande                 | 37         | 38         | 28          | 39        | 41         | 37         |               | 37         |
| Eftergymnasial utbildning/högskola                     | 16         | 14         | 1           | 5         | 19         | 25         |               | 15         |
| Procentbas, antal                                      | 283        | 207        | 87          | 87        | 187        | 129        |               | 490        |
| Bortfall, antal                                        | 2          | 2          | 1           | 0         | 1          | 2          |               | 4          |
| <b>Totalt, antal</b>                                   | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |               | <b>494</b> |

**Tabell 9.2 Läs- eller skrivsvårigheter. Andel per kön och åldersgrupp (I3). Procent.**

|                      | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år & äldre | Samtliga   |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
|                      | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |               |            |
| Ja                   | 22         | 19         | 24          | 21        | 25         | 13         |               | 21         |
| Nej                  | 78         | 81         | 76          | 79        | 75         | 87         |               | 79         |
| Procentbas, antal    | 268        | 196        | 82          | 82        | 175        | 125        |               | 464        |
| Bortfall, antal      | 17         | 13         | 6           | 5         | 13         | 6          |               | 30         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |               | <b>494</b> |

**Tabell 9.3 Huvudsakligt försörjningssätt de senaste sex månaderna.  
Andel per kön och åldersgrupp (I5a\_1). Procent.**

|                                   | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                                   | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Lön, a-kassa                      | 19         | 9          | 12          | 17        | 13         | 16         |                  | <b>15</b>  |
| Ekonomiskt bistånd                | 32         | 35         | 43          | 27        | 37         | 26         |                  | <b>33</b>  |
| Pension                           | 12         | 6          | 0           | 0         | 2          | 34         |                  | <b>10</b>  |
| Ersättning från Försäkringskassan | 11         | 21         | 10          | 19        | 18         | 13         |                  | <b>15</b>  |
| Kriminalitet                      | 13         | 11         | 12          | 23        | 13         | 4          |                  | <b>12</b>  |
| Annat                             | 13         | 18         | 23          | 14        | 17         | 7          |                  | <b>15</b>  |
| Procentbas, antal                 | 281        | 208        | 86          | 86        | 186        | 131        |                  | <b>489</b> |
| Bortfall, antal                   | 4          | 1          | 2           | 1         | 2          | 0          |                  | <b>5</b>   |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

**Tabell 9.4 När klienten senast hade ett regelbundet arbete.  
Andel per kön och åldersgrupp (I6c). Procent.**

|                                | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                                | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Under det senaste året         | 21         | 19         | 30          | 15        | 18         | 19         |                  | <b>20</b>  |
| 1-2 år sedan                   | 14         | 18         | 20          | 21        | 16         | 8          |                  | <b>16</b>  |
| 3-5 år sedan                   | 24         | 22         | 14          | 34        | 23         | 21         |                  | <b>23</b>  |
| 6-10 år sedan                  | 14         | 12         | 3           | 11        | 18         | 16         |                  | <b>13</b>  |
| Mer än 10 år sedan             | 16         | 10         | 0           | 0         | 11         | 35         |                  | <b>13</b>  |
| Har aldrig arbetat regelbundet | 11         | 20         | 33          | 20        | 14         | 1          |                  | <b>15</b>  |
| Procentbas, antal              | 266        | 188        | 79          | 82        | 172        | 121        |                  | <b>454</b> |
| Bortfall, antal                | 19         | 21         | 9           | 5         | 16         | 10         |                  | <b>40</b>  |
| <b>Totalt, antal</b>           | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

**Tabell 9.5 Typ av skulder. Andel per kön och åldersgrupp (I8b). Procent.**

|                  | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |    | 45 år &<br>äldre | Samtliga  |
|------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|----|------------------|-----------|
|                  | Man | Kvinna | 18-24 år    | 25-29 år | 30-44 år |    |                  |           |
| Hyresskuld       | 20  | 28     | 18          | 24       | 29       | 16 |                  | <b>23</b> |
| Drogskuld        | 12  | 15     | 23          | 21       | 13       | 3  |                  | <b>13</b> |
| Lån/krediter     | 54  | 61     | 44          | 58       | 59       | 59 |                  | <b>57</b> |
| Spelskuld        | 2   | 0      | 0           | 1        | 2        | 1  |                  | <b>1</b>  |
| Underhållsbidrag | 11  | 8      | 2           | 3        | 15       | 12 |                  | <b>10</b> |
| Skadestånd       | 32  | 24     | 16          | 31       | 39       | 16 |                  | <b>29</b> |
| Annan skuld      | 45  | 38     | 42          | 39       | 43       | 42 |                  | <b>42</b> |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 24,7 – 25,3 procent.

## I 0. Sysselsättning och fritid

Den vanligaste sysselsättningen bland LVM-klienterna de senaste sex månaderna är missbruk/kriminalitet (53 procent). Det är 14 procent som varit i vård eller behandling, 12 procent som arbetat, 4 procent som varit arbetssökande och 2 procent som studerat.

### TABELLFÖRTECKNING

*Denna del besvaras av klienterna*

Tabell 10.1 Huvudsaklig sysselsättning, senaste sex månaderna (J1a\_1)

### TABELLER

**Tabell 10.1 Huvudsaklig sysselsättning de senaste sex månaderna.  
Andel per kön och åldersgrupp (J1a\_1). Procent.**

|                               | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | 45 år &<br>äldre | Samtliga   |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
|                               | Man        | Kvinna     | 18-24 år    | 25-29 år  | 30-44 år   |            |                  |            |
| Arbetat                       | 15         | 7          | 13          | 11        | 8          | 16         |                  | <b>12</b>  |
| Studerat                      | 2          | 2          | 2           | 2         | 3          | 0          |                  | <b>2</b>   |
| Varit i vård eller behandling | 11         | 18         | 14          | 14        | 16         | 12         |                  | <b>14</b>  |
| Sökt arbete                   | 5          | 3          | 2           | 3         | 4          | 5          |                  | <b>4</b>   |
| Missbruk/kriminalitet         | 52         | 54         | 58          | 62        | 54         | 42         |                  | <b>53</b>  |
| Annat                         | 15         | 15         | 10          | 7         | 15         | 24         |                  | <b>15</b>  |
| Procentbas, antal             | 281        | 209        | 86          | 87        | 187        | 130        |                  | <b>490</b> |
| Bortfall, antal               | 4          | 0          | 2           | 0         | 1          | 1          |                  | <b>4</b>   |
| <b>Totalt, antal</b>          | <b>285</b> | <b>209</b> | <b>88</b>   | <b>87</b> | <b>188</b> | <b>131</b> |                  | <b>494</b> |

# Referenser

SFS 1988:870. *Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall*. Stockholm: Socialdepartementet. ([https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall\\_sfs-1988-870](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870).)

Socialstyrelsen. (2021). *LVM – Handbok för socialtjänsten*.

Statens institutionsstyrelse. (2023). *Behandlingsmetoder*. (<https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/behandlingsmetoder/>).

Statens institutionsstyrelse. (2022). *Riktlinjer för arbete med kunskapsbaserade program*. Dnr 1.4.2-904-2022.

Statens institutionsstyrelse. (2020). *Rutin för behandlingsplanering LVM*. Dnr 1.4.2-6806-2020.

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*.

Statens institutionsstyrelse. (2017). *SiS-DOK. Manual med anvisningar till formulären*.

Statens institutionsstyrelse. (2023). *SiS i korthet 2022*.

Statens institutionsstyrelse. (2023). *SiS årsredovisning 2022*.

